

Allertec WZF 0,01 g 7 tabletek powlekanych



Cena: 18,60 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	7 tabletek (blister)
Postać	tabletki powlekane
Producent/ Dystrybutor	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cetirizinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład Substancja czynna: dichlorowodorek cetyryzyny 10 mg; substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, poliwidon 25, stearynian magnezu, skrobi glikolan sodu, dwutlenek krzemu koloidalny, laurylosiarczan sodu; skład otoczki: hydroksypropylometylceluloza, makrogol 6000. **Wskazania** Przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny) Alergiczne zapalenie spojówek Przewlekła idiopatyczna pokrzywka. **Działanie** Cetyryzyna jest silnie działającym, selektywnym lekiem przeciwhistaminowym II generacji blokującym receptor H1. Hamuje wczesną fazę reakcji alergicznej, w której pośredniczy histamina, a także późną, ponieważ zmniejsza migrację komórek (eozynofilów) i uwalnianie mediatorów odczynu zapalnego. Łagodzi skurcz mięśni gładkich powodowany przez histaminę. Cetyryzyna jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi po podaniu dawki 10 mg występuje po 30-60 min. Wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza. Wydalana głównie z moczem. **Dawkowanie** Doustnie. Dorośli: zwykle 10 mg na dobę, jednorazowo. U chorych z niewydolnością nerek i wątroby, ze względu na przedłużenie okresu półtrwania leku, zaleca się rozpoczynać leczenie od 5 mg (1/2 tabletki) na dobę. Dzieci powyżej 6 lat o masie ciała do 30 kg: 5 mg (1/2 tabletki) na dobę, w jednej dawce a dzieci powyżej 6 lat o masie ciała od 31 kg: 10 mg na dobę w jednej dawce. **Przeciwwskazania** Nadwrażliwość na składniki leku lub hydroksyzynę. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.