

## Fenistil Krople doustne 20 ml



Cena: 36,95 pln

### Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	20 ml
Postać	krople
Producent/ Dystrybutor	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Dimetindenum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Skład** 1 ml kropli doustnych zawiera: substancję czynną: maleinian dimetindenu 1 mg, substancje pomocnicze: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, edetynian sodu, wodorofosforan sodu dziesięciowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sól sodowa sacharyny, woda oczyszczona. **Wskazania** Leczenie objawowe alergicznych chorób skóry (pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego i wyprysku endogennego) oraz alergicznych chorób układu oddechowego (alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa), alergii pokarmowej i polekowej. Łagodzenie świądu w przebiegu chorób zakaźnych (m.in. ospa wietrzna), a także łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu owadów. Profilaktycznie stosowany jest w zapobieganiu reakcjom alergicznym występującym po znieczuleniu. **Działanie** Lek przeciwhistaminowy Fenistil krople hamuje działanie histaminy - substancji odpowiedzialnej za reakcje alergiczne. **Przeciwwskazania** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; noworodki do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzone. **Dawkowanie** Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 3-6 mg maleinianu dimetyndenu podawane w 3 równych podzielonych dawkach. Zaleca się stosowanie od 20 do 40 kropli 3 razy na dobę. U pacjentów ze skłonnością do senności należy stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli rano. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Niemowlęta w wieku po ukończeniu 1 miesiąca do ukończenia 1 roku życia: 3-10 kropli 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 1 do 3 lat: 10-15 kropli 3 razy na dobę. Dzieci w wieku 3 do 12 lat: 15-20 kropli 3 razy na dobę. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.