

## Stoperan 2 mg 18 kapsułek



Cena: 21,43 pln

### Opis słownikowy

Dawka	2 mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	18 kapsułek
Postać	kapsułki twarde
Producent/ Dystrybutor	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Loperamidum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Skład** Jedna kapsułka twarda zawiera 2 mg chlorowodoru loperamidu oraz substancje pomocnicze. **Wskazania** Stoperan można stosować u dorosłych, pacjentów w podeszłym wieku oraz u dzieci od 6. roku życia. Lek mogą przyjmować osoby cierpiące zarówno na ostrą, jak i przewlekłą postać biegunki. Stoperan zawiera najbardziej uniwersalną substancję o działaniu przeciwbiegunkowym. Pomaga w wielu typach biegunki infekcyjnej, także w tzw. grypie żołądkowej, której przyczyną są wirusy. Stoperan osiąga efekt terapeutyczny także w biegunkach, na które nie pomagają inne leki dostępne bez recepty: - w alergiach pokarmowych, - nietolerancji laktozy i glutenu, - w biegunce stresowej, - w biegunce wywołanej zespołem jelita drażliwego (IBS), - a nawet w biegunce towarzyszącej cukrzycy. Stoperan może także być stosowany przez pacjentów leczących choroby przewlekłe, np. nadciśnienie, cukrzycę i inne, ponieważ nie wpływa na wchłanianie oraz skuteczność przyjmowanych jednocześnie leków. Z tego powodu Stoperan to również dobry wybór dla kobiet stosujących antykoncepcję. **Działanie** Działanie Stoperanu odczuwalne jest w ciągu godziny po podaniu. Jego substancja czynna łączy się z receptorami obecnymi na powierzchni jelita, uspokajając ich perystaltykę i ograniczając konieczność natychmiastowego wypróżnienia. Przyspiesza także wchłanianie wody z jelita grubego, co poprawia konsystencję stolca oraz zapobiega odwodnieniu. Stoperan nie podrażnia śluzówki przewodu pokarmowego i jest łagodny dla żołądka, nie wpływa też na florę jelitową. Lek jest praktycznie w całości metabolizowany w wątrobie i z żółcią wydalany z organizmu. **Dawkowanie** Szczegóły dawkowania: Biegunka ostra - dorośli i dzieci 12+: Pierwsza dawka: 2 kapsułki Kolejne dawki - 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu, maksymalna dawka dobową - 8 kapsułek Biegunka ostra - dzieci od 6. do 12. roku życia: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu, Maksymalna dawka dobową 3 kapsułki Biegunka przewlekła - dorośli i dzieci 12+ początkowo 1 kapsułka 2 razy na dobę, w razie potrzeby 1 kapsułka 4-6 razy na dobę, maksymalna dawka 6 kapsułek. Biegunka przewlekła - dzieci od 9. do 12. roku życia: dawka 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu, maksymalna dawka dobową - 3 kapsułki. Biegunka przewlekła - dzieci od 6. do 9. roku życia: dawka 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu, maksymalna dawka dobową : 2 kapsułki. Nie zaleca się stosowania leków zawierających loperamid u dzieci poniżej 6. roku życia. Jeśli podczas leczenia ostrej biegunki w ciągu 48 godzin nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.