

Voltaren Acti Forte 25 mg 10 tabl.

Cena: 15,89 pln



Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Dawka | 0,025 g |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Opakowanie | 10 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent/ Dystrybutor | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Diclofenac potassium |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Tabletki Voltaren Acti Forte 25 mg, zawierają, jako substancję czynną, diklofenak potasu, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, zmniejsza również gorączkę. Voltaren Acti Forte łagodzi objawy stanu zapalnego takie jak ból i obrzęk poprzez blokowanie syntezy cząsteczek (prostaglandyn) odpowiedzialnych za stan zapalny, ból i gorączkę. Voltaren Acti Forte nie wpływa na przyczyny stanu zapalnego i gorączki. **Wskazania** Ból mięśni, bóle reumatyczne, ból głowy, ból zęba, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bóle menstruacyjne. **Dawkowanie** W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. **Dorośli i młodzież powyżej 14 lat** Dawka początkowa to 1 tabletki. Jeśli jest to konieczne, można stosować 1 tabletkę, co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletek w ciągu doby. Tabletkę należy połknąć w całości popijając szklanką wody. W celu osiągnięcia największej skuteczności leku, lek Voltaren Acti Forte powinno się przyjmować przed jedzeniem. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana Nie należy stosować leku Voltaren Acti Forte przez dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki bez porozumienia z lekarzem. Jeśli objawy nasilią się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. **Skład 1 tabletki powlekanej zawiera** 25 mg substancji czynnej diklofenaku potasowego substancje pomocnicze: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon, magnezu stearynian, sacharoza, talk, powidon, makrogol 8000, celuloza mikrokrystaliczna, barwnik dispersed Red 16158, żelaza tlenek (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).