

## Albothyl globulki 6 globulek

Cena: 66,27 pln



### Opis słownikowy

Dawka	0,09 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	6 globulek
Postać	globulki dopochwowe
Producent/ Dystrybutor	TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Policresulenum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Skład** Substancja czynna: 1 globulka zawiera 90 mg kwasu polimetyleno-m-krezolosulfonowego. **Wskazania** Miejscowe leczenie zapaleń, zakażeń i uszkodzeń tkanek pochwy i szyjki macicy: nadżerki części pochwowej szyjki macicy, upławy (również pochodzenia bakteryjnego, rzęsiastkowego i grzybiczego), zapalenie pochwy i szyjki macicy, owrzodzenie wywołane uciskiem pesariów, hamowanie krwawienia po biopsji lub usunięciu polipów macicy. **Działanie** Preparat do stosowania miejscowego o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwprzotniakowym. Działa na bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne (w tym Gardnerella vaginalis), beztlenowe oraz grzyby i Trichomonas vaginalis. Złuszcza martwe i chorobowo zmienione komórki nabłonka walcowatego, co przyspiesza gojenie. Hamuje krwawienia poprzez koagulację białek i silne obkurczenie naczyń. Preparat wchłania się przez błonę śluzową macicy i jest wydalany przez nerki. **Dawkowanie** Dopochwowo 1 globulka raz dziennie (na noc) lub co drugi dzień. **Przeciwwskazania** Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować w czasie miesiączki. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.