

Gynauxil 10 glob.dopochw.



Cena: 55,08 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 glob.
Postać	glob.dopochw.
Producent/ Dystrybutor	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

SkładGlukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinianetylenosorbitolu, etoksylogowany alkohol cetostearynowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.**Wskazania**Wyrób medyczny w postaci zestalonej emulsji olejowo-wodnej, zawierający składniki sprzyjające adhezji do błony śluzowej pochwy.**Działanie**Globulki zawierają kwas hialuronowy w postaci częściowo uwodnionego hialuronianu oraz składniki odżywcze pobudzające rozwój pałeczek zwanych Lactobacillus vaginalis, stanowiący główny komponent prawidłowej biocenozy pochwy.Po założeniu do pochwy i stopieniu w temperaturze ciała globulka ulega przekształceniu w mukoadhezyjną emulsję wiążącą się z błoną śluzową. Kwas hialuronowy posiada właściwości regenerujące nabłonek, utrzymuje wilgoć, pobudzające procesy naprawy i odnowy tkanek. Ekstrakt drożdżowy to źródło witamin z grupy B oraz aminokwasów i nukleotydów wraz z elektrolitem wody fazy emulsji sprzyja selektywnemu namnażaniu pałeczek rodzaju Lactobacillus.**Dawkowanie**Kobiety miesiączkujące/ w okresie rozrodczym: zakładać dzień po dniu po globulce przez 5 kolejnych dni, począwszy od -go dnia po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do dni następných po sobie cyklach menstruacyjnych lub do czasu uzyskania poprawy.Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: zakładać dzień po dniu po globulce przez 10 kolejnych dni. Zrobić około tygodnie przerwy, po której można wznowić stosowanie.Jeżeli pojawi się miesiączka, stosowanie należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.