

## Prospan syrop 0,035 g/5ml 100 ml



Cena: 29,55 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,035 g/5ml
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Hederae helicis folii extractum siccum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Skład**(100 ml): standaryzowany suchy wyciąg z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum 5:1) 0,7 g. Ekstrahent - etanol 30% (m/m) Substancje pomocnicze: sorbitol płynny krystalizujący, sorbitan potasu, kwas cytrynowy bezwodny, guma ksantanowa, aromat wiśniowy, woda oczyszczona. Lek nie zawiera cukru. **Wskazania** Prospan zalecany jest, jako preparat pomocniczy, w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem, gdyż rozrzedza wydzielinę w oskrzelach i ułatwia oddychanie. **Działanie** Prospan syrop to lek o potrójnym działaniu w leczeniu kaszlu: \* rozrzedza gęstą wydzielinę i pomaga w jej odkrztuszeniu \* zmniejsza napięcie mięśni gładkich oskrzeli \* łagodzi odruch kaszlowy Dzięki opisanemu powyżej działaniu, Prospan® może być stosowany w leczeniu zarówno kaszlu produktywnego jak i nieproduktywnego ("suchego" i mokrego"). Prospan: \* zawiera suchy wyciąg z liści bluszczu, o przebadanym, udokumentowanym i skutecznym działaniu \* można go łączyć z innymi lekami (np. antybiotykami czy środkami przeciwbólowymi) \* występuje w postaci syropu i kropli \* nie zawiera cukru – mogą go stosować chorzy na cukrzycę \* nie zawiera alkoholu \* nie zawiera sztucznych barwników \* do stosowania u dzieci i dorosłych **Dawkowanie** Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia: przyjmują po 5 ml syropu 3 razy dziennie. Jeżeli jest to konieczne, dawka dla dorosłych może być zwiększona do 7,5 ml syropu 3 razy dziennie. Dzieci w wieku 6-9 lat: przyjmują 5 ml; syropu 3 razy dziennie. Dzieci w wieku 1-5 lat: przyjmują 2,5 ml syropu 3 razy dziennie. U dzieci poniżej 1 roku życia należy skonsultować z lekarzem. **Przeciwwskazania** Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na składniki leku. **Działania niepożądane** Bardzo po przyjęciu leków zawierających wyciąg z bluszczu mogą wystąpić reakcje alergiczne, jak np.: duszność, obrzęk, zaczerwienienie, swędzenie skóry. U osób wrażliwych niezbyt często mogą pojawić się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego jak np. nudności, wymioty, biegunka oraz działanie przeczyszczające związane z zawartością sorbitolu. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.