

## NEBU PULMO roztwór do inhalacji 20amp. po 5ml

Cena: 54,10 pln



### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 amp. po 5 ml
Postać	roztwór do inhalacji
Producent/ Dystrybutor	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Natrium
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Nebu Pulmo wspomaga usuwanie nadmiaru wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, stabilizuje komórki nabłonkowe, poprawia funkcje surfaktantu płucnego i łagodzi stan zapalny, ułatwiając w ten sposób oddychanie. Zawarta w preparacie ektoina stabilizuje błonę śluzową, błony komórkowe, białka zewnątrzkomórkowe, makrocząsteczki oraz łagodzi stan zapalny w płucach. Preparat Nebu Pulmo wskazany jest do stosowania w terapii inhalacyjnej u pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę, astmę (o podłożu alergicznym i niealergicznym), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz stany alergiczne dróg oddechowych wywołane wdychaniem alergenów, takich jak kurz lub pyłki. **Działanie** rozbija wiązania jonowe wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i sprężystość wydzieliny, pobudza odruch kaszlu i wykrztuszania jako mechanizmów wspomagających usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udroźnienia dróg oddechowych, absorbuje wodę z błony śluzowej i podśluzowej, zmniejszając obrzęk ścian dróg oddechowych, a następnie nawilża śluzówkę. **Skład** sterylny roztwór chlorku sodu 3%, ektoina. **Stosowanie** Do jednorazowej inhalacji używać 5 ml roztworu lub postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat może być podawany za pomocą dowolnego rodzaju nebulizatora. Należy przestrzegać sposobu użytkowania wskazanego przez producenta urządzenia. **Przeciwwskazania** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. **Ostrzeżenia** Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu ampułki należy ją natychmiast zużyć i wyrzucić po użyciu, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia mogącego stanowić źródło infekcji. U pacjentów bardzo wrażliwych preparat należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela. W przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności. Nie stosować, jeśli ampułka jest uszkodzona. Nie stosować razem z innymi preparatami bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.