

Dolgit krem 0,05 g/1g 50g

Cena: 24,92 pln



Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/g
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	krem
Producent/ Dystrybutor	DOLORGIET PHARMACEUTICALS
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Krem Dolgit zawiera substancję Ibuprofen, który działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance. Dolgit krem stosuje się miejscowo w bólach mięśni, bólach towarzyszących w przebiegu chorób stawów, w bólach reumatycznych. **Wskazania** Dolgit krem jest wskazany do miejscowego leczenia reumatyzmu mięśniowego, chorób zwyrodnieniowych i zapalnych stawów i kręgosłupa, stanów zapalnych tkanek miękkich stawów np. kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgniastych, więzadeł i torebek stawowych. Może być również stos. w bólach krzyża, w sztywności barku. Substancja czynna: Ibuprofenum **Stosowanie** Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj nakłada się i wciera w skórę 3 do 4 razy na dobę pasek kremu o długości 4 do 10 cm (2 g do 5 g kremu, co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu). W razie konieczności można lek stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny. Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym. Wchłanianie substancji czynnych przez skórę jest większe podczas zabiegów jonoforezy (rodzaj elektroterapii). Krem Dolgit stosuje się pod katodą (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm² powierzchni elektrody, a czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut. Czas trwania takiego leczenia ustala lekarz. Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza. Dawka dobową nie powinna przekraczać 12 g kremu (600 mg ibuprofenu). **Przeciwwskazania** Preparat Dolgit krem nie może być stosowany na błony śluzowe i otwarte rany. Nie jest wskazany do leczenia dzieci do 14 roku życia.