

## Magne B6 60 tabletek

Cena: 30,03 pln



### Opis słownikowy

Dawka	0,048g Mg2++5mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	60 tabl. (3 blist. po 20 tabl.)
Postać	tabletki powlekane
Producent/ Dystrybutor	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochloridum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Magne B6 jest lekiem, który zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek Magne B6 uzupełnia niedobory magnezu i/lub witaminy B6 w organizmie. Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%. Niedobory magnezu mogą wskazywać następujące objawy: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. **Wskazania** Lek Magne B6 jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu, które mogą wystąpić w różnych sytuacjach fizjologicznych (na przykład niedostateczna podaż magnezu, po intensywnym wysiłku fizycznym albo w przypadku przewlekłego stresu lub braku snu) jak i patologicznych (np. wrodzony zespół zaburzeń wchłaniania). Substancja czynna: Magnesium lactate, Pyridoxini hydrochloridum **Skład** Substancjami czynnymi leku Magne B6 są: jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) 48 mg Mg2+ (1,97 mmol) oraz pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 5 mg. Substancje pomocnicze to: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934, talk, magnezu stearynian. Skład otoczki: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, wosk Carnauba. **Dawkowanie** Dorośli: od 6 do 8 tabletek Magne B6 na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków. Dzieci w wieku 6 lat lub starsze (o masie ciała około 20 kg): od 4 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków. Lek Magne B6 należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. **Przeciwwskazania** uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.), jednoczesne stosowanie lewodopy.