

Eloprine syrop 0,25 g/5ml 150 ml



Cena: 28,17 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,25 g/5ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	150 ml
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	Polfarmex s.a.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Inosinum pranobexum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). 1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu. 5 ml syropu (1 miarka) zawiera 250 mg inozyny pranobeksu. Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan [E 218], propylu parahydroksybenzoesan [E 216], sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, aromat pomarańczowy płynny, woda oczyszczona. **Wskazania** Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych. **Działanie** Lek Eloprine zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, który wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego. **Dawkowanie** Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) Zalecana dawka dobową wynosi 50mg/kg masy ciała na dobę (1 ml na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielnych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 80 ml syropu na dobę). Dzieci w wieku powyżej 1 roku Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby. Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta. Masa ciała, Dawkowanie: 10 - 14 kg, 3 x 5 ml * 15 - 20 kg, 3 x 5 do 7,5 ml * 21 - 30 kg, 3 x 7,5 do 10 ml * 31 - 40 kg, 3 x 10 do 15 ml * 41 - 50 kg, 3 x 15 do 17,5 ml * W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować miarkę dozującą, dołączoną do opakowania. Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.