

## SULPHUR BUSKO Reumogel żel 130G (butelka)

Cena: 58,61 pln



### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	130 g (butelka)
Postać	żel
Producent/ Dystrybutor	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Nazwa:** Reumogel

**Postać:** żel

**Dawka:** -

**Opakowanie:** 130 g (but.)

**Skład:** W 100,0g produktu leczniczego znajduje się: substancja czynna: 48,0g wodnego wyciągu borowinowego; substancje pomocnicze: 2,0g metylcelulozy; 1,2g etanolu 70%; 0,2g etylu parahydroksybenzoesanu; 0,1g mentolu; woda dest. ad.100

**Działanie:** - przeciwzapalne- przeciwbólowe- jonoforeza/ fonoforezaSubstancje aktywne zawarte w skoncentrowanym wyciągu borowinowym działają przeciwzapalnie (poprzez hamowanie aktywności hialuronidazy i obniżenie stężenia czynników nasilających procesy zapalne). Wyzwolenie ciał histaminopodobnych powoduje efekt przekrwienia skóry, poprawia się mikrokążenie w tkankach, co przyspiesza procesy naprawcze. Podniesienie progu odczuwania bólu zmniejsza dolegliwości bólowe. Korzystne działanie na stawy związane jest również z działaniem cytokin działających ochronnie na chrząstkę stawową.Leczenie reumogelem w przeciwieństwie do klasycznych zabiegów borowinowych nie wymaga zastosowania czynnika termicznego. Temperatura klasycznego zabiegu borowinowego to 42-46oC, czasu trwania zabiegu to 20-30 minut, co jest niekorzystne dla chorych z nadciśnieniem, chorobami układu krążenia, znacznie osłabionych, z zaawansowaną osteoporozą.Jonoforeza / FonoforezaW sanatoriach i zakładach fizykoterapii wykorzystuje się wodne wyciągi borowinowe i żele do zabiegów jonoforezy (katoda - prąd galwaniczny 10-20 mA) oraz zabiegów fonoforezy (ultradźwięków) w dawce 0,2-0,6 W/cm2.

**Wskazania:** - Choroba zwyrodnieniowa stawów- Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

: Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu w tym etylu parahydroksybenzoesan. Zachować szczególną ostrożność stosując reumogel, gdyż leku nie należy stosować na uszkodzoną skórę (np. rany , oparzenia)

**Działania niepożądane:** Dotychczas nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby.

**Dawkowanie:** 2-3x dziennie lekkim masażem wcierać żel w chore stawy i mięśnie. Zaleca się stosowanie przez okres 2-3 tygodni.