

Acard 75 mg 30 tabletek dojelitowych

Cena: 12,32 pln



Opis słownikowy

Dawka	75 mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki dojelitowe
Producent/ Dystrybutor	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Wskazania Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka; świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca; niestabilna choroba wieńcowa; prewencja wtórna u osób po przebytych zawałach serca; stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej; zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwienemu udaru mózgu u pacjentów z TIA; po przebytych udarach niedokrwienym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych; zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka; zapobieganie zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki. **Dawkowanie** Podanie doustne. Tabletki dojelitowe produktu Acard mają otoczkę i nie rozpadają się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości. **Uwaga:** w świeżym zawałach serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych. W takim przypadku tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie. **Zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka:** Zwykle 1 tabletki dojelitowa (75 mg) na dobę. **Świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca:** Jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie! **Niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytych zawałach serca:** Zwykle 1 tabletki dojelitowa (75 mg) na dobę. **Stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej:** Zwykle 1 tabletki dojelitowa (75 mg) na dobę. **Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwienemu udaru mózgu u pacjentów z TIA (ang. TIA – transient ischaemic attacks):** Zwykle 1 tabletki dojelitowa (75 mg) na dobę. **Po przebytych udarach niedokrwienym mózgu u pacjentów z TIA:** 1 tabletki dojelitowa (75 mg) na dobę. **U osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych:** Zwykle 1 tabletki dojelitowa (75 mg) na dobę. **Zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka:** Zalecana dawka dobową 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 mg do 150 mg). **Zapobieganie zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki:** 1 do 2 tabletek dojelitowych (75 mg do 150 mg) na dobę. **Skład** Jedna tabletki dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).