

Opokan 7,5 mg 30 tabletek



Cena: 36,22 pln

Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Dawka | 7,5 mg |
| Kraj produkcji | Polska |
| Opakowanie | 30 tabletek |
| Postać | Tabletki |
| Producent/ Dystrybutor | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Meloxicamum |
| Wsyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

DZIAŁANIELek ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jest stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych I stawów. **WSKAZANIA**Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa. **DAWKOWANIE**Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. Zazwyczaj stosowana dawka, to: 1 tabletkę (7,5 mg) na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: 1 tabletkę (7,5 mg) na dobę. Pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę. Pacjenci z chorobami wątroby: nie należy przekraczać dawki 7,5 mg na dobę. Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. **SKŁAD**Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletkę zawiera 7,5 mg meloksykamu. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.