

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy 100 ml



Cena: 37,42 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	100 ml (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent/ Dystrybutor	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład Substancją czynną leku jest: ibuprofen 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu. **Wskazania** Lek Nurofen Forte dla dzieci jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach: - gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego), - bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po ekstrakcji zębów, bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. **Działanie** Lek łagodzi takie dolegliwości jak gorączka, ból i obrzęk. **Dawkowanie** Do opakowania dołączony jest dozownik w formie strzykawki, z podziałką ułatwiającą dawkowanie. Należy odkręcić nakrętkę butelki (nacisnąć do dołu i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara) Dozownik należy mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki. Butelkę należy energicznie wstrząsnąć. Aby napełnić dozownik, butelkę należy odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesunąć tłok dozownika do dołu wciągając zawiesinę do pożądanego miejsca na podziałce. Butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wykręcić dozownik, wyjąć do z butelki. Końcówkę dozownika należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno nacisnąć tłok, ostrożnie opróżnić zawartość dozownika. Po zastosowaniu butelkę należy zamknąć zakręcając nakrętkę, a dozownik umyć i wysuszyć. Nie należy stosować większej dawki niż zalecana. **Niemowlęta** od 3 do 6 miesięcy 3 razy po 1,25 ml; niemowlęta od 6 do 12 miesięcy 3 do 4 razy po 1,25 ml; **dzieci** od 1 do 3 lat 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby; **dzieci** od 4 do 6 lat 3 razy po 3,75 ml w ciągu doby; **dzieci** od 7 do 9 lat 3 razy po 5 ml w ciągu doby; **dzieci** 10 do 12 lat 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby; **dorośli i dzieci** w wieku powyżej 12 lat dawką rekomendowaną w objawowym leczeniu bólu i gorączki jest 3 razy po 10 ml w ciągu doby, do ustąpienia objawów. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.