

Diclostim 0,74 mg/ml roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 150 ml



Cena: 36,06 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,74 mg/ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	150 ml
Postać	roztwór do płukania
Producent/ Dystrybutor	SOLINEA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Diclostim jest to produkt leczniczy, który zawiera jako substancję czynną diklofenak o działaniu przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym, przeciwbólowym. **Skład** Substancją czynną leku jest diklofenak. Każdy ml roztworu do płukania gardła / jamy ustnej zawiera 0,74 mg diklofenaku (Diclofenacum) w postaci diklofenaku sodowego. Substancje pomocnicze: sorbitol (E 420); acesulfam potasowy (E 950); disodu edetynian; sodu benzoatan (E 211); choliny chlorek; sodu wodorowęglan; disodu fosforan dwuwodny; glikol propylenowy (E 1520); lewomentol; glicerol; aromat czarnej porzeczki (glikol propylenowy E 1520, składniki poprawiające smak i zapach, naturalne składniki poprawiające smak i zapach, pulegon); aromat miętowy (glikol propylenowy E 1520, trioctan glicerolu E 1518, naturalne składniki poprawiające smak i zapach); aromat cytrynowy (etanol, woda, składniki poprawiające smak i zapach, naturalne składniki poprawiające smak i zapach); dzerwień koszenilowa (E 124); diwodorofosforan sodu dwuwodny; woda oczyszczona. **Dawkowanie** Lek Diclostim należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty lub informacją zawartą w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund. Po użyciu roztwór należy wypłuć. **Działanie** Diclostim zawiera jako substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). Podczas stosowania miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. **Wskazania** Lek Diclostim stosuje się w leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego). **Przeciwwskazania** Nie należy stosować leku Diclostim: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glimbax; jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny); u dzieci w wieku poniżej 14 lat.