PUH MAJ
Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

Herbapect syrop bez cukru 150 g

Cena: 20,66 pln

Opis słownikowy

Dawka	(0,498g+0,348g+0,087g)/5ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	125 ml (150 g)
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Thymi extractum fluidum, Primula officin
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Działanie wykrztuśne. Produkt leczniczy przeznaczony do tradycyjnego stosowania w nieżytach górnych dróg oddechowych, meczącym tzw. „suchym kaszlu" oraz przy utrudnionym odkrztuszaniu. Jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. **Skład** 5 ml syropu zawiera substancje czynne: 498 mg wyciągu z ziela tymianku (Thymus vulgaris L., herba) (1:2) rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (V/V), woda amoniakalna 25%, glicerol 95%; 349 mg nalewki z pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L., radix) (1:5) rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V); 87 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący. Produkt leczniczy zawiera 6,4 - 9,0% (v/v) etanolu, tj. maksymalnie 378,8 mg etanolu w 5 ml syropu. **Sposób użycia** Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać produkt leczniczy. Dzieci powyżej 6 lat i młodzież do 18 lat - 2,5 ml, dorośli - 5 ml 3 - 4 razy dziennie po jedzeniu. Maksymalna dawka dobowa. Nie należy przyjmować więcej niż 20 ml syropu dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 7 dni. **Wskazania** Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Męczący tzw. "suchy kaszel". Utrudnione odkrztuszanie. **Przeciwwskazania** Nadwrażliwość na ziele tymianku, pierwiosnek, sulfagwajakol lub na substancję pomocniczą. Astma. Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup).