

Levopront syrop 0,06g/10 ml 120 ml



Cena: 37,54 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,06 g/10ml
Kraj produkcji	Włochy
Opakowanie	120 ml (butelka)
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Levodropropizinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład Levodropropizyna, sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, substancja poprawiająca smak i zapach wiśniowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny **Wskazania** Levodropropizyna - substancja czynna leku Levopront, charakteryzuje się głównie obwodowym (o punkcie uchwytu w oskrzelach i tchawicy) działaniem przeciwkaszlowym oraz działaniem przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Levopront wskazany jest w objawowym leczeniu kaszlu. Jeśli po dwóch tygodniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent gorzej się czuje, należy zwrócić się do lekarza. **Działanie** **Sposób użycia** Produkt leczniczy stosuje się 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin. Dzieci: 10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na dobę; 20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę. Dorośli- 10 ml syropu do 3 razy na dobę. **Sposób podawania** Levopront należy stosować doustnie. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć 3, 5 i 10 ml. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza. W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po dwóch tygodniach leczenia zaleca się przerwać zażywanie produktu leczniczego i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.