


Pyrantelum OWIX 250 mg / 5 ml zawiesina doustna 15 ml



Cena: 27,18 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,25 g/5ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	15 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent/ Dystrybutor	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Pyrantelum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Zawiesina doustna Pyrantelum OWIX to lek przeciw pasożytniczy, podawany w leczeniu owsicy. Zawiesina zawiera jako substancję czynną – pyrantel, stosowany w leczeniu zakażeń jelitowych robakami obłymi typu nicieni barwy białej (owsikami). Pyrantelum Medana przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych. Lek nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków. **Skład** Substancją czynną leku jest pyrantel. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu). Substancje pomocnicze: sodu benzoosan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbitat 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona. Przed zastosowaniem wstrząsnąć zawartość butelki. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek podaje się doustnie, niezależnie od posiłku. Przed użyciem zawiesiny Pyrantelum OWIX należy wstrząsnąć zawartość butelki, do uzyskania jednorodnego płynu. Dawki leku należy odmierzać za pomocą dołączonej do opakowania miarki z podziałką. Zalecane dawkowanie Pyrantelum OWIX dla dorosłych i dzieci od 2 lat o wadze od 11 kg to: 11 mg/kg masy ciała jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. **Działanie** Pyrantelum OWIX działa przeciw pasożytniczo, oddziałując na mięśnie pasożytów jelitowych. Lek powoduje unieruchomienie pasożytów i usunięcie ich z jelit dzięki ruchom perystaltycznym. Pyrantelum OWIX nie podrażnia jelit oraz nie wywołuje przemieszczania się robaków. Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach. **Wskazania** Wskazaniem do stosowania Pyrantelum OWIX jest owsica, po stwierdzonym występowaniu ich w kale i/lub okolicy odbytu. Objawy wystąpienia owsicy obserwuje się głównie u dzieci. Choroba występuje jednak w każdym wieku, choć bardzo często dzieci są jej głównymi nosicielami (pasożytami można się zarazić np. w żłobkach, przedszkolach, piaskownicy) i łatwy sposób może dojść do zakażenia pozostałych osób wspólnie mieszkających. Owsica objawia się silnym uczuciem swędzenia w okolicy odbytu (nie występuje u wszystkich zakażonych), przeważnie w nocy co wywołuje często stany zapalne. U dzieci zarażonych owsikami może występować rozdrażnienie, nerwowość, bezsenność, moczenie nocne lub bóle brzucha i brak apetytu. U dziewczynek dochodzi nieraz do zapalenia sromu i pochwy, co objawia się swędzeniem, pieczeniem i białymi upławami. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Galeria

Masa ciała	Dawka jednorazowa (ml)	Dawka jednorazowa (mg)
12-14 kg	2,5 ml	125 mg
17-20 kg	5,0 ml	250 mg
20-29 kg	7,5 ml	375 mg
40-50 kg	10,0 ml	500 mg
51-62 kg	12,5 ml	625 mg
63-75 kg	15,0 ml	750 mg
Doradzić o masie ciała > 75 kg	20,0 ml	1000 mg