

Canditon globulki dopochwowe 10 globulek

Cena: 38,25 pln



Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 globulek
Postać	globulki
Producent/ Dystrybutor	HEXANOVA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Globulki dopochwowe **Canditon** są wyrobem medycznym, który pomaga w odbudowie naturalnych mechanizmów obronnych pochwy. Polecane do stosowania w celu zapobieganiu i leczeniu dolegliwości pochwy, w tym o charakterze grzybiczym.- Zawartość kwasu bornego, kwasu mlekowego i polikarbofilu, pomaga eliminować objawy związane z brakiem równowagi pH pochwy i zaburzoną florą bakteryjną pochwy.- Kwas mlekowy, naturalnie występujący w pochwie, sprzyja natychmiastowej poprawie pH i ułatwia naturalną odbudowę delikatnego ekosystemu sromu i pochwy.- Kwas borny, dzięki utrzymywaniu się w ekosystemie pochwy, sprzyja długotrwałemu obniżeniu pH pochwy przez długi czas.- Polikarbofil, po związaniu ze śluzem pochwy, może w sposób długotrwały uwalniać jony H+, które utrzymują właściwe pH środowiska pochwy. **Sposób użycia**- Umyć dokładnie okolice sromu i pochwy (najlepiej środkiem do mycia pochwy i sromu). - Otworzyć opakowanie i po umyciu rąk, wyjąć jedną globulkę z blistra.- Delikatnie wprowadzić globulkę głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji leżącej na plecach, by uniknąć przypadkowego wypadnięcia globulki z pochwy. **Działanie** Canditon jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości pochwy, w tym o charakterze grzybiczym. Pomaga zmniejszyć podrażnienia, świąd i uczucie pieczenia. **Składniki** Jedna globulka zawiera: kwas borny, polikarbofil, kwas mlekowy, octan tokoferylu, palmitynian witaminy A, kwas 18-beta-glicyretynowy, olejek z drzewa herbacianego, fosfatydylocholinę, półsyntetyczne triglicerydy.