

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm 20tabl.



Cena: 7,39 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	20 tabl. (pojemnik)
Postać	tabl.
Producent/ Dystrybutor	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Produkt ziołowy
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Nazwa: Tabl.p/niestrawności Labofarm
Postać: tabl.
Dawka: -
Opakowanie: 20 tabl. (pojem.)
Skład:

Silybi mariani fructus extr. (25:1) - Ekstrakt z owocu ostropestu - 7 mg Taraxaci radix - Korzeń mniszka - 100 mg Carvi fructus - Owoc kminku - 50 mg Menthae folium - Liść mięty - 60 mg Frangulae cortex - Kora kruszyny - 60 mg Silici dioxydum colloidale - Koloidalny dwutlenek krzemu - 0,3 mg Solani amyllum - Skrobia ziemniaczana ad 300 mg

Działanie:

- pobudza wytwarzanie i przepływ żółci - rozkurcza mięśnie gładkie jelit i dróg żółciowych - odtruwająco i ochronnie na komórki miększu wątroby - wspomaga perystaltykę jelit - łagodnie przeczyszcza

Wskazania:

- nudności - zgaga - uczucie pełności w żołądku - wzdęcia - przewlekłe zaparcia - zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego - pomocniczo w lżejszych uszkodzeniach wątroby - pomocniczo w leczeniu otyłości

:

- ciąża i okres karmienia - dla dzieci do lat 12 - nadwrażliwość na glikozydy antranoïdowe (kora kruszyny). - preparatu nie należy

stosować w przypadku niedrożności jelit, niedrożności dróg żółciowych, bólów brzucha o nieustalonej etiologii, ostrych zapalnych schorzeń jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego i w okresie menstruacji, - preparatu nie należy stosować dłużej niż 7-10 dni bez porozumienia z lekarzem, - w przypadku kamicy żółciowej możliwość stosowania skonsultować z lekarzem.

Działania niepożądane:

- przedawkowanie wywołuje biegunkę i tym samym usunięcie leku z jelita grubego, co chroni przed objawami toksycznymi. Przy przedawkowaniu może dojść do utraty elektrolitów w szczególności jonów potasu. Należy uzupełnić niedobór płynów i elektrolitów.

Interakcje:

- przy przewlekłym stosowaniu i zwiększonym dawkowaniu może wystąpić niedobór jonów potasu, co powoduje wzmożenie działania równocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych. Straty potasu pogłębia równoczesne stosowanie środków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy oraz korzenia lukrecji.

Dawkowanie:

- 2-3 tabletki 3 razy dziennie popijając 100 ml (1/2 szklanki) wody. - osoby w wieku podeszłym: 1-2 tabletek 3 razy dziennie.

Dawkowanie (dzieci):

- dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabletek 3 razy dziennie. - decyzję o podaniu leku dziecku w wieku poniżej 12 lat może podjąć lekarz pediatra.