

AMARA Lactulosum syrop 7,5 g/15ml 200 ml



Cena: 26,52 pln

Opis słownikowy

Dawka	7,5 g/15ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Liquid lactulose
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy ciekłej (Lactulosum liquidum), 1 ml syropu zawiera 500 mg laktulozy ciekłej. Substancje pomocnicze: aromat truskawkowy, kwas cytrynowy, woda oczyszczona. **Wskazania** W przewlekłych zaparciach, encefalopatii w przebiegu niewydolności wątroby u dorosłych (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa). **Działanie** Działanie syropu opiera się na właściwościach substancji czynnej. Laktuloza jest syntetycznym disacharydem, który po podaniu doustnym nie ulega rozkładowi z udziałem enzymów trawiennych i praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Zmiękcza on stolec i ułatwia jego przemieszczanie, powodując przenikanie wody do jelita. **Dawkowanie** Zaparcia: - dorośli: dawka początkowa: 15–45ml, dawka podtrzymująca: 15–30ml, - dzieci (7-14 lat): dawka początkowa: 15ml, dawka podtrzymująca: 10–15ml, - dzieci (1-6 lat): dawka początkowa: 5–10ml, dawka podtrzymująca: 5–10 ml, - niemowlęta (poniżej 1 roku): dawka początkowa: do 5ml, dawka podtrzymująca: do 5ml. Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy – tylko u osób dorosłych: dawka początkowa: 3–4 razy na dobę po 30–45ml. Dawka podtrzymująca: należy ją ustalić w taki sposób, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.