

Pyralgina 50 tabletek

Cena: 64,30 pln



Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Metamizolum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Tabletki Pyralgina to lek do stosowania w bólu o dużym nasileniu oraz gorączce. **Składniki** Substancją czynną jest: metamizol sodowy (Metamizolum natrium). 1 tabletkę zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, magnezu stearynian. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek podaje się doustnie. Tabletki należy przyjmować popijając wystarczającą ilością wody, w trakcie lub po posiłku. Dawkowanie Pyralginy u osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat (przy masie ciała minimum 53 kg) przy sporadycznych bólach i gorączce to 1 tabletkę (500 mg) do 2 tabletek (1000 mg). Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 2 tabletki (1000 mg metamizolu), natomiast maksymalna dawka dobową to 6 tabletek (3000 mg metamizolu). Nie stosować leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Dawkowanie leku należy dostosować w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, osób z obniżonym klirensiem kreatyniny oraz z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. **Działanie** Pyralgina zawiera metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz rozkurczowe na mięśnie gładkie. Metamizol należy do nieopiodowych leków przeciwbólowych z grupy pochodnych pirazolonu. **Wskazania** Pyralginę stosuje się w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu i gorączce, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.