


## Enterol Forte proszek 500 mg 14 saszetek



Cena: 68,93 pln

### Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Kraj produkcji	Francja
Opakowanie	14 saszetek
Postać	proszek
Producent/ Dystrybutor	BIOCODEX
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Saccharomyces boulardii
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Charakterystyka** Enterol Forte to produkt leczniczy o działaniu przeciwbiegunkowym zawierającym drożdżaki *Saccharomyces boulardii*.  
**Skład** Substancją czynną leku są: liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. Jedna saszетка zawiera liofilizowane drożdżaki *Saccharomyces boulardii* co odpowiada 500 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat Tutti-frutti. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty. Produkt stosować doustnie. Zawartość saszетки należy wsypać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, wymieszać i natychmiast wypić. Proszek z saszетки można także mieszać z pokarmem. Należy pamiętać aby woda lub pokarm nie były zbyt gorące. Ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 saszetek na dobę przez okres do 1 tygodnia. Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków oraz choroby zapalne jelit: 1 do 2 saszetek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii. Działania niepożądane podczas eradykacji *H. pylori*: 1 do 2 saszetek na dobę. Biegunka spowodowana zakażeniem *C. difficile*: 2 saszетки na dobę przez okres do 4 tygodni. **Działanie** Enterol Forte wpływa na florę jelitową, jest tzw. "substytutem naturalnej flory", który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia. **Wskazania** Lek Enterol Forte do stosowania doustnego jest stosowany w: leczeniu ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganiu biegunkom poantybiotykowym; przypadku działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego podczas leczenia eradykacyjnego *Helicobacter pylori*; nawracającej biegunki spowodowanej zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem.