

Allertec WZF 0,01 g 10 tabletek powlekanych



Cena: 14,00 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent/ Dystrybutor	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cetirizinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Allertec WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu)- w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwałe utrzymujące się silnie swędzące bąble na skórze).

Przeciwwskazania Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, hydroksyzynę, pochodne piperazyny. Nie stosować w u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10ml/min. Nie stosować w przypadku osób z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. **Działania niepożądane** Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą pojawić się działania niepożądane. Należy przerwać stosowanie i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpić pierwsze objawy nadwrażliwości – obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, trudności w oddychaniu/przełykaniu. Częste działania niepożądane: zmęczenie, senność, suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa. Niezbyt częste działania niepożądane: ból brzucha, astenia, złe samopoczucie, zaburzenia czucia, pobudzenie, świąd, wysypka. Rzadkie działania niepożądane: przyspieszone bicie serca, obrzęki, uczulenie, nieprawidłowa czynność wątroby, zwiększenie masy ciała, pokrzywka, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność. Bardzo rzadkie działania niepożądane: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, tiki, zaburzenia oddawania moczu, obrzęk naczynioruchowy, wysypka pępekowa. Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: zwiększenie apetytu, amnezja, zaburzenia pamięci, zatrzymanie moczu.