

## Claritine Allergy Syrop 60 ml



Cena: 32,28 pln

### Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	60 ml
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Loratadinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Skład** 5 ml syropu zawiera: substancję czynną: 5 mg loratadyny, substancje pomocnicze: glikol propylenowy, glicerynę, kwas cytrynowy jednowodny, sodu benzoian, sacharozę, aromat brzoskwinowy, wodę oczyszczoną. **Działanie** Claritine Allergy łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takie jak: kichanie, swędzenie i wodnista wydzielina z nosa, swędzenie i pieczenie oczu. Lek może być również stosowany w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (swędzenie, zaczerwienienie skóry). Działanie lecznicze polegające na złagodzeniu tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz do normalnego snu. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. **Dawkowanie** Dorosli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat – dawkowanie zależy od masy ciała: Masa ciała większa niż 30 kg: 10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami. Masa ciała 30 kg lub mniejsza: Nie jest wskazane stosowanie leku Claritine Allergy. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby: Dorosli i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg: 10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) co drugi dzień. **Przeciwwskazania** Kiedy nie stosować leku Claritine Allergy: jeśli pacjent ma uczulenie na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), u kobiet w ciąży. **Ostrzeżenia i środki ostrożności** Przed rozpoczęciem stosowania Claritine Allergy należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty: jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby. **Działania niepożądane** Jak często lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u dzieci w wieku od 2 do 12 lat są: ból głowy, nerwowość i zmęczenie. Do najczęściej występujących działań niepożądanych u dorosłych i młodzieży należą: senność, ból głowy, zmniejszony apetyt i problemy ze snem, jak również zmęczenie, suchosć w ustach, nudności (mdłota), zapalenie błony śluzowej nosa i wysypka. Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka, obrzęk). Jeżeli wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano bardzo rzadko również inne działania niepożądane: zawroty głowy, nieregularne lub szybkie bicie serca, rozstrój

z?oła?dka, zaburzenia czynnos?ci wa?troby, wypadanie w?osów. **Informacja** Przed u?yciem zapoznaj się z ulotką do?ączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niew?a?ciwie stosowany zagraża Twojemu ?yciu lub zdrowiu.