


Calcium Sandoz+Vitamin C 10 tabletek musujących



Cena: 25,74 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,26g Ca ²⁺ +1g
Kraj produkcji	Austria
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent/ Dystrybutor	SANDOZ GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Calcii glubionate, C.carbonas, Ac.ascorb czynna
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład 1 tabletkę musującą zawiera: substancje czynne: Laktoglukonian wapnia 1.0 g, Węglan wapnia 0.327 g Kwas askorbowy (witamina C) 1.0 g - równoważne 260 mg wapnia zjonizowanego. Składniki pomocnicze: Sacharynian sodu; glikol polietylenowy 4000; sacharoza; wodorowęglan sodu; bezwodny kwas cytrynowy; beta-karoten; aromat gorzki, aromat francuski "polvaromas"; aromat cytrynowy "tetarome". **Wskazania i działanie** Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu koniecznej dla jego właściwego funkcjonowania. Stanowi istotny składnik tkanki kostnej i jest niezbędny dla jej prawidłowego rozwoju, jak również dla procesów sprawnego działania nerwów, mięśni, serca, a także prawidłowego krzepnięcia krwi. Dodatkowo wapń pośredniczy również w działaniu hormonów a zmniejszając przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działa przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo. Kwas askorbowy (witamina C) należy do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie i odgrywa ważną rolę w procesach biologicznych. Bierze udział w procesach utleniania i redukcji, jest niezbędny w procesie wytwarzania kolagenu, tkanki chrzęstnej, zębiny, elastyny, odbudowie tkanek i detoksykacji organizmu. Duże dawki witaminy C do 1 g na dobę są skuteczne w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Niedobory wapnia i kwasu askorbowego mogą być spowodowane wynikiem niewłaściwego odżywiania się lub zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony organizmu. **Wskazania do stosowania:** zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C w: spadku odporności organizmu; w przebiegu chorób infekcyjnych; w okresie rekonwalescencji; w leczeniu następstw niedoborów wapnia i witaminy C; wspomagająco w leczeniu przeziębień i grypy; u osób palących papierosy. **Dawkowanie** Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody. Dorośli i dzieci powyżej 7. roku życia: 1 tabletkę musującą dziennie. Dzieci w wieku od 3. do 7. lat: 0,5 tabletki musującej dziennie. Niemowlęta: zgodnie z zaleceniami lekarza. **Przedawkowanie** Dotychczas nie zgłoszono przypadków ostrego przedawkowania Calcium Sandoz + Vitamin C orange. Takie przedawkowanie mogłoby spowodować łagodne zaburzenia żołądkowo - jelitowe. W razie przypadkowego przedawkowania leku w okresie przyjmowania wysokich dawek witaminy D należy pić dużo wody i porozumieć się lekarzem. **Przeciwwskazania** Preparatu Calcium Sandoz + Vitamin C orange nie powinny przyjmować osoby uczulone na którykolwiek z jego składników (lista składników została podana w tej ulotce w części skład), osoby z kamicą szczawianową dróg moczowych, anemią syderoblastyczną, hemochromatozą oraz wrodzonym deficytem krwinkowej dehydrogenazy - G-6-P. Jak również osoby z hiperkalcemią (wysokim poziomem wapnia we krwi), z hiperkalcurią (wysokim poziomem wapnia w moczu) oraz osoby z ciężką niewydolnością nerek. Zalecane

środki ostrożności: w przypadku łagodnej hiperkalcurii (zbyt dużo wapnia w moczu), której towarzyszy niewielkie lub umiarkowane upośledzenie czynności nerek, lub gdy w przeszłości dochodziło do powstawania kamieni w drogach moczowych - należy kontrolować poziom wapnia wydalanego z moczem i zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów. W razie potrzeby dawkę leku można zmniejszyć lub przerwać jego stosowanie. Niewskazane jest podawanie wit. C pacjentom w czasie radio- i/lub chemioterapii. Dawka dobową kwasu askorbowego powyżej 1 g może fałszować wyniki analiz w krwi i moczu opartych na reakcjach utleniania i redukcji. Calcium Sandoz + Vitamin C orange zawiera kwas cytrynowy, toteż preparatu nie powinni stosować pacjenci z ciężkim upośledzeniem czynności nerek, szczególnie gdy otrzymują oni preparaty zawierające glin. Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć pod uwagę, że jedna tabletką Calcium Sandoz + Vitamin C orange zawiera 2.0 g cukru. Pacjenci wymagający stosowania diety niskosodowej, muszą wziąć pod uwagę, że zawartość sodu w jednej tabletkę musującej leku wynosi 0.27 g. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią: preparat Calcium Sandoz + Vitamin C orange może być przyjmowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną: preparat Calcium Sandoz + Vitamin C orange nie wykazuje wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.