

## Compeed Dyskretny Plaster leczniczy leczeniowy na opryszczkę 15 szt.



Cena: 40,40 pln

### Opis słownikowy

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Dawka                     | -                            |
| Kraj produkcji            | Polska                       |
| Opakowanie                | 15 szt.                      |
| Postać                    | -                            |
| Producent/<br>Dystrybutor | MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O. |
| Rejestracja               | Wyrób medyczny inny          |
| Substancja<br>czynna      | -                            |
| Wysyłka<br>zamówienia     | w 24 h                       |

### Opis produktu

Compeed na opryszczkę jest pierwszym, dyskretnym, plasterem leczniczym na opryszczkę wargowa. Nieprzerwane działanie aż do 12h\* już od pierwszego zastosowania – aby szybko leczyć. Każdy dyskretny plaster tworzy optymalne środowisko do leczenia i pozostaje na skórze aż do 12 godzin\*. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić. Działa jak tarcza antywirusowa\*\*. Ukrywa opryszczkę. Na plaster można nałożyć makijaż lub szminek. \* W badaniu klinicznym z udziałem 174 uczestników u 25% badanych plaster utrzymywał się na skórze przez 12 godzin lub dłużej. \* Plaster działa jak tarcza antywirusowa, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia opryszczką. **Sposób użycia** Dla uzyskania najlepszych rezultatów plaster należy zastosować od razu, jak tylko pojawia się pierwsze objawy opryszczki, takie jak uczucie mrowienia, swędzenia i pieczenia. Stosować plaster nieprzerwanie w ciągu dnia i w nocy. Kontynuować stosowanie aż do całkowitego wyleczenia. Skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem, jeśli opryszczka jest bolesna i/lub nie udało się jej wyleczyć w ciągu 20 dni. **Przeciwwskazania** Nie stosować na rany zakażone, inne niż opryszczka. Osoby z cukrzycą lub zaburzeniami odporności powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Pod plasterem nie wolno stosować innych preparatów na opryszczkę do nakładania miejscowego. **Ostrzeżenia** Nie dotykać zmienionego miejsca w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się wirusa na inne części ciała albo na inne osoby. W przypadku dotknięcia opryszczki natychmiast umyć ręce. W trakcie wystąpienia opryszczki nie dotykać ani nie pocierać rekami oczu. Nie korzystać ze wspólnych naczyń czy szklanek, szminek, szczoteczek czy nawet ręczników. Zawsze przechowywać plastry w pudełku.