

Dexak SL 25 mg 20 saszetek



Cena: 37,77 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,025 g
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	20 saszetek
Postać	granulat
Producent/ Dystrybutor	BERLIN CHEMIE AG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Dexketoprofenum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Dexak SL 25 mg 20 saszetek
Wskazania Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.
Skład 1 saszетка granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem oraz substancje pomocnicze: amonu glicyryzynian, neohesperydyno-dihydrochalkon, żółcień chinolinowa (E 104), aromat cytrynowy, sacharoza z krzemionką koloidalną uwodnioną. Każda saszетка zawiera 2,5g sacharozy.
Działanie Przeciwwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
Dawkowanie - dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5mg co 4-6 godzin lub 25mg co 8 godzin, co najmniej 30 minut przed posiłkiem. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75mg deksketoprofenu. Stosować doustnie. Aby przygotować roztwór należy zawartość saszетки rozpuścić w 250ml wody i dobrze rozmieszać. Wypić natychmiast po przygotowaniu.
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na deksketoprofen, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; czynna choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie lub ich podejrzenie, jak również nawracająca się choroba wrzodowa żołądka lub krwawienia (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrządzenia lub krwawienia) lub przewlekła niestrawność; krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; krwawienie z przewodu pokarmowego lub inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego; astma oskrzelowa; ciężka niewydolność serca; umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny)