

Etopiryna 10 tabl.



Cena: 5,69 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,3g+0,1g+0,05g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 tabl. (blister w pudeł.)
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalic., Ethylsalicyl., Coff
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

WSKAZANIABóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.**Dawkowanie**Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłku, z dużą ilością wody. Leku nie należy stosować dłużej niż kilka dni. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat: od 1 do 2 tabletek jednorazowo lub w razie potrzeby tę samą dawkę co 8 godzin. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Skład1 tabletki zawiera: substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 300mg, etenzamid 100mg, kofeina 50mg; pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna.**PRZECIWSKAZANIA**nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs;astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczyńioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);ciężka niewydolność wątroby lub nerek;ciężka niewydolność serca;