

## Fervex 8 saszetek smak cytrynowy



Cena: 21,29 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,5g+0,2g+0,025g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	8 saszetek
Postać	granulki
Producent/ Dystrybutor	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum, Acidum ascorbicum, Phenir czynna
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Dawkowanie** Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę. Należy zachować odstęp między kolejnymi dawkami (co najmniej 4 godziny). Jeżeli pacjent posiada zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami. Sposób użycia Zawartość saszетки należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, na wieczór, jak najszybciej od wystąpienia objawów. **Wskazania** doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat. **Przeciwwskazania** Preparatu nie należy stosować, jeśli pacjent posiada nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie zażywać preparatu posiadając ciężką niewydolność wątroby lub nerek, jaskrę z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu. Nie należy podawać dzieciom poniżej 15 lat, pacjentom z nietolerancją fruktozy, pacjentom posiadającym zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (Fervex zawiera sacharozę).