

Pyralgina Gorączka 6 sasz.



Cena: 21,43 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g/sasz.
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	6 sasz.a 1,168g (granul.)
Postać	gran.do sp.roztw.doust.
Producent/ Dystrybutor	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Metamizolum magnesicum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Lek Pyralgina Gorączka należy do nieopiodowych leków przeciwbólowych z grupy pochodnych pirazonu o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działa również rozkurczowo na mięśnie gładkie. Wskazania Lek wskazany jest w leczeniu gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka **Dorośli** Dawkowanie jest uzależnione od natężenia gorączki i indywidualnej wrażliwości pacjenta na metamizol. Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Dawka jednorazowa wynosi od 500 mg do 1000 mg (od 1 do 2 saszetek). Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1 g (2 saszetki), maksymalna dawka dobową 3 g (6 saszetek). **Sposób podawania** Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody. Lek należy stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach. Leku nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem lub niezwłocznie udać się do lekarza, gdy mimo przyjęcia leku, objawy nasilają się. Substancja czynna: metamizolum magnesicum **Skład** Substancja czynna 1 saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezowego w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego. **Pozostałe składniki** mannitol, powidon K29/32, sacharyna sodowa, aromat pomarańczowy, żółcień pomarańczowa (E110).