

## Scopolan 10 mg 30 tabletek



Cena: 35,27 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,01 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hyoscine butylbromide
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Scopolan 10 mg tabletki drażowane 30 sztuk** Scopolan to produkt leczniczy stosowany w dolegliwościach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcz żołądka, kolka jelitowa, kolka żółciowa, kolka nerkowa). **Skład** Substancją czynną jest - butylobromek hioscyny. 1 tabletki drażowana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum). Substancje pomocnicze - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, guma arabska, sacharoza, talk, magnezu stearynian. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania doustnego i doraźnego. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat - doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat - doustnie 1 tabletki drażowana 2 razy na dobę. **Działanie** Scopolan wykazuje działanie spazmolityczne na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. **Wskazania** - dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (skurcz żołądka, kolka jelitowa, Zespół Jelita Drażliwego), dróg żółciowych (kolka żółciowa), - dolegliwości bólowe układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową). **Przeciwwskazania** Kiedy nie stosować leku Scopolan- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych, - w przypadku uczulenia na alkaloidy tropanowe (np. atropina) i ich pochodne, - jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenną jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka, zwężenie szyi pęcherza moczowego, tachykardię, nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, - nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.