

## Scopolan compositum 10 tabletek



Cena: 20,49 pln

### Opis słownikowy

Dawka	0,01g+0,25g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hyoscini hydrobromidum , Metamizolum nat czynna
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Scopolan compositum 10 mg+250 mg tabletki drażowane 10 sztuk** Jest produktem leczniczym stosowanym w bolesnych skurczach przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo-płciowego. **Skład** Substancjami czynnymi są butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) oraz metamizol sodowy jednowodny (Metamizolum natriicum monohydricum). 1 tabletkę drażowaną zawiera 10 mg butylobromku hioscyny i 250 mg metamizolu sodowego jednowodnego. Substancje pomocnicze - talk, guma arabska, żelatyna wieprzowa, glicerol, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171). **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zwykle stosowane dawka dla dorosłych to 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo. Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1-2 tabletki drażowane do 3 razy na dobę. Lek należy stosować wyłącznie doraźnie (w przypadku wystąpienia dolegliwości). Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Leku nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy się nasilą mimo stosowania leku, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. **Działanie** Scopolan compositum jest lekiem złożonym. Butylobromek hioscyny działa rozkurczająco a metamizol sodowy przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Lek znosi skurcze mięśni gładkich w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. **Wskazania** Scopolan compositum stosuje się w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych- przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego),- dróg żółciowych (np. kolka żółciowa),- układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie). Scopolan compositum jest wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. **Przeciwwskazania** Kiedy nie stosować leku Scopolan compositum- nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,- uczulenie na alkaloidy tropanowe i ich pochodne,- zmiany w obrazie morfologicznym krwi,- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,- ostra porfiria wątrobowa,- ostra niewydolność nerek lub wątroby,- jaskra z wąskim kątem przesączania,- rozrost prostaty,- niedrożność porażenna jelit,- zaparcia atoniczne,- zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka,- zwężenie szyi pęcherza moczowego,- tachykardia,- nużliwość mięśni (myasthenia gravis,- patologiczne poszerzenie jelita grubego.