PUH MAJ
Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

Theraflu ExtraGRIP 14 saszetek

Cena: 46,41 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,65g+0,01g+0,02g
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	14 saszetek
Postać	proszek
Producent/ Dystrybutor	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum, Phenylephrinum, Phenirami
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Theraflu ExtraGRIP 14 saszetek To lek stosowany przy objawach grypy i przeziębienia. Lek działa wielokierunkowo, ponieważ zawiera 3 substancje czynne. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, chlorowodorek fenylefryny zmniejsza przekrwienie oraz obrzęk błony śluzowej nosa, natomiast feniramina łagodzi kichanie, świąd błony śluzowej nosa i zatok. **Skład** Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), maleinian feniraminy (Pheniramini maleas). 1 saszetka zawiera: 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodoreku fenylefryny , 20 mg maleinian feniraminy. Substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Theraflu ExtraGRIP stosuje się doustnie, po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają po 5 dniach albo gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni pomimo stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 saszetka, jeśli jest taka potrzeba dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Maksymalna dawka dobowa 3 saszetki. **Działanie** Theraflu ExtraGRIP zawiera 3 substancje aktywne i działa wielokierunkowo: - Paracetamol - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, - chlorowodorek fenylefryny - zmniejsza przekrwienie oraz obrzęk błony śluzowej nosa, - maleininan feniraminy – substancja antyhistaminową, która łagodzi objawy uczuleniowe, takie jak: kichanie, świąd lub przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok.