

Furaginum Hasco Max 0,1 g 30 tabletek



Cena: 15,62 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Furazidinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Lek Furaginum Hasco MAX stosuje się w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dróg moczowych, u osób w wieku powyżej 15 lat. **Właściwości** Lek Furaginum Hasco MAX zawiera furazydynę, zwaną także furaginą, jako substancję czynną. Furazydyna jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych. **Dawkowanie** Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (1 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (1 tabletki) 3 razy na dobę. Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furazydyny. Kreska dzieląca umożliwia podzielenie tabletki na dwie równe dawki. Lek stosuje się przez 7-10 dni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpiły po 7-10 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach. **Składniki** Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum), zwana także furaginą. 1 tabletki zawiera 100 mg furazydyny. - Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia żelowana, kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy 50