

## BOBOLEN porost islandzki syrop 120 ml



Cena: 27,35 pln

### Opis słownikowy

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Dawka                     | -                        |
| Kraj produkcji            | Polska                   |
| Opakowanie                | 120 ml                   |
| Postać                    | syrop                    |
| Producent/<br>Dystrybutor | POLSKI LEK               |
| Rejestracja               | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna         | -                        |
| Wysyłka zamówienia        | w 24 h                   |

### Opis produktu

Bobolen Porost islandzki Syrop na Kaszel to wyrób medyczny przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia. Zawiera ekstrakt z porostu islandzkiego, cynk oraz koncentraty soków z malin i aronii.

**Wskazania** Zalecany do stosowania w suchym, drażniącym kaszlu, w bólu gardła, w podrażnieniu i przesuszeniu błony śluzowej gardła oraz chrypce spowodowanej m.in. nadmiernym przeciążeniem strun głosowych.

**Działanie** Zawiera ekstrakt z porostu islandzkiego, cynk oraz koncentraty soków z malin i aronii. Zawarte w poroście islandzkim substancje śluzowe działają powlekająco i ochronnie na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, łagodzą podrażnienia wywołane suchym drażniącym kaszlem, bólem gardła, suchym powietrzem i chrypką spowodowaną m. in. nadmiernym przeciążeniem strun głosowych.

**Skład** Ekstrakt z porostu islandzkiego, pozostałe składniki: cytrynian cynku, syrop maltitolowy, woda oczyszczona, koncentrat soku z malin, koncentrat soku z aronii, aromat, sorbinian potasu.

**Sposób użycia** W przypadku stosowania u dzieci syrop można rozcieńczyć np. z herbatą lub ciepłą wodą.

**Dawkowanie** Dzieci w wieku od 1 do 6 lat: w zależności od potrzeby 1 do 2 razy na dobę po 5 ml (1 łyżeczka). Dzieci i młodzież od 6 do 16 lat: 3 do 4 razy na dobę po 5 ml (1 łyżeczka). Dorośli: 3 do 4 razy na dobę po 10 ml (2 łyżeczki).

**Przeciwwskazania** Zastosowanie zbyt dużych ilości może mieć działanie przeczyszczające. Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

**Ostrzeżenia** Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności zamieszczony jest na kartoniku oraz etykiecie butelki. Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie.

**Uwagi do stosowania** Stosować zgodnie z instrukcją użycia. Nie używać z innymi preparatami podawanymi doustnie. Produkt może być w razie potrzeby stosowany przez dłuższy czas. Jednak w przypadku braku poprawy bądź nasileniu objawów po tygodniu należy zasięgnąć porady lekarza. Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania niniejszego wyrobu medycznego przez kobiety w okresie ciąży i laktacji. Przed zastosowaniem należy zasięgnąć porady lekarza.