


Deflegmin Junior syrop (15 mg/5 ml) 120 ml



Cena: 18,70 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,015 g/5ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ambroxolum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Deflegmin Junior syrop (15 mg/5 ml) 120 ml Lek Deflegmin Junior w postaci syropu jest lekiem o działaniu rozrzedzającym wydzielinę górnych dróg oddechowych. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i usprawnia jego transport. Skutkuje to łatwiejszym odkrztuszaniem wydzieliny i złagodzeniem kaszlu. **Skład** Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum) 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodoru. Substancje pomocnicze: sorbitol roztwór, glicerol, glikol propylenowy, sodu benzoesan, woda oczyszczona, aromat maskujący, kwas solny 10% (do ustalenia pH). **Dawkowanie** To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie, przez pierwsze 2 do 3 dni, 10 ml syropu 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 10 ml syropu 2 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat - doustnie, 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat - doustnie, 2,5 ml syropu 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 1 do 2 lat - doustnie, 2,5 ml syropu 2 razy na dobę. Jeśli po upływie 4 do 5 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku przed snem. **Działanie** Lek Deflegmin zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. **Wskazania** Deflegmin Junior stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych. **Przeciwwskazania** Kiedy nie stosować leku Deflegmin Junior- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku- bezpośrednio przed snem.