

Deflegmin syrop (30 mg/5 ml) 120 ml



Cena: 22,57 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,03 g/5ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ambroxolum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Deflegmin syrop (30 mg/5 ml) 120 ml Deflegmin w postaci syropu jest lekiem rozrzedzającym wydzielinę w drogach oddechowych, dzięki czemu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. Lek zawiera chlorowodorek ambroksolu i można stosować go krótkotrwale u dzieci od 1 roku życia oraz u osób dorosłych. **Skład** Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum). 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodoru. Pozostałe składniki leku to - sorbitol roztwór, glicerol, glikol propylenowy, sodu benzoesan, woda oczyszczona, aromat maskujący, kwas solny 10% (do ustalenia pH). **Dawkowanie** To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku Deflegmin w postaci syropu Dzieci w wieku od 1 do 2 lat - 1,25 ml 2 razy na dobę Dzieci w wieku od 2 do 6 lat - 1,25 ml 3 razy na dobę Dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 2,5 ml 2 razy na dobę Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - początkowo (przez 2 do 3 dni) 5 ml syropu 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 5 ml syropu 2 razy na dobę. W przypadku, gdy po upływie 4 do 5 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. **Działanie** Deflegmin działa dwukierunkowo. Ambroksol zawarty w leku wykazuje właściwości mukolityczne oraz wykrztuśne. Działanie wykrztuśne związane jest z zwiększeniem wydzielania śluzu w drogach oddechowych oraz poprawą jego transportu, dzięki temu odkrztuszanie staje się łatwiejsze, a kaszel łagodniejszy. **Wskazania** Deflegmin stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych. **Przeciwwskazania** Nie stosować leku- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,- bezpośrednio przed snem.