


Gardimax Medica 24 tabletki do ssania



Cena: 31,93 pln

Opis słownikowy

Dawka	5mg+1mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	24 tabletki
Postać	tabletki do ssania
Producent/ Dystrybutor	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Chlorhexidini dihydrochloridum, Lidocain czynna
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Skład 1 tabletki do ssania zawiera: 5 mg dichlorowodorek chlorheksydyny (Chlorhexidini dihydrochloridum) + 1 mg chlorowodorek lidokainy (Lidocaini hydrochloridum). **Wskazania** Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. -nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą -stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat **Działania niepożądane** -w rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej (wysypki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej) -możliwość pojawienia się zaburzeń smaku, uczucia pieczenia na języku lub reakcji anafilaktycznych -po długotrwałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć **Interakcje** Z uwagi na możliwe interakcje, należy unikać stosowania antyseptyków. Należy unikać stosowania połączeń środków znieczulających miejscowo i inhibitorów cholinesterazy. Chlorowodorek lidokainy może zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki wpływające na jej powstawanie np. sulfonamidy. Cymetydyna, leki beta-adrenolityczne, norepinefryna, anestetyki wziewne hamują metabolizm lidokainy poprzez zmniejszenie przepływu wątrobowego, prowadząc do zwiększenia stężenia leku w surowicy. Barbiturany, ryfampicyna, fenytoina przyspieszają metabolizm lidokainy poprzez aktywację enzymów mikrosomalnych wątroby. Lidokaina nasila działanie leków zwiotczających mięśnie poprzecznie prądkowane. **Dawkowanie (dorośli)** Dorośli: 6 do 10 tabletek na dobę, tabletki ssać powoli. Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego : 3 do 4 dni. **Dawkowanie (dzieci)** Dzieci w wieku od 6 lat: połowa dawki dla dorosłych (3 do 5 tabletek do ssania na dobę). Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. **Środki ostrożności** -leki odkażające nie wyjaławiają; czasowo zmniejszają ilość mikroorganizmów w jamie ustnej i w gardła - należy ograniczyć stosowanie tego produktu do przypadków kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne. Produktu nie należy stosować długotrwale. Nie należy ssać jedną tabletkę bezpośrednio po drugiej - z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli istnieją obawy poprzedzające drgawki -należy unikać stosowania produktu u osób szczególnie skłonnych do alergii -w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej wrażliwości w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połknięcia i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia - należy unikać przyjmowania pokarmów i napojów bezpośrednio po zastosowaniu produktu leczniczego. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje ryzyko oparzeń jamy ustnej oraz gardła,

spowodowanych przyjmowaniem zbyt gorących napojów oraz pokarmów. Produkt zawiera sorbitol. Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy -produkt nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków **Prowadzenie pojazdów** Nie stwierdzono wpływu Gardimax medica na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. **Przedawkowanie** Z uwagi na zawartość lidokainy mogą wystąpić objawy przedawkowania oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy i na układ sercowo-naczyniowy: - niepokój, ziewanie, nerwowość, dzwony uszne, oczopląs, drżenie mięśni, drgawki, depresja, niewydolność oddechowa -spadek napięcia mięśnia sercowego, rozszerzenie naczyń obwodowych, niedociśnienie, bradykardia, zaburzenie rytmu serca, zatrzymanie akcji serca **Ciąża** Produktu tego nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.