

Zatoxin inhalacje, roztwór do inhalacji 10fiol. po 3ml

Cena: 45,47 pln



Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Dawka | - |
| Kraj produkcji | Polska |
| Opakowanie | 10 fiolek po 3 ml |
| Postać | roztwór do inhalacji |
| Producent/ Dystrybutor | TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | - |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Zatoxin Inhalacje to roztwór do inhalacji do stosowania wziewnego, składający się z hipertonicznego roztworu opartego na ekstraktach ziołowych: melisy lekarskiej, pachnotki zwyczajnej i macierzanki piaskowej w połączeniu z kwasem hialuronowym. Nebulizacja substancją nawilżającą, taką jak kwas hialuronowy przywraca poziom nawilżenia, przynosząc ulgę podrażnionej błonie śluzowej. Ekstrakty ziołowe wykazują działanie antyoksydacyjne i łagodzące przyczyniając się do przywrócenia fizjologicznej równowagi błony śluzowej dróg oddechowych. Roztwór do inhalacji Zatoxin Inhalacje jest sterylny oraz nie zawiera konserwantów. **Działanie** Roztwór do inhalacji Zatoxin Inhalacje wskazany jest, aby przeciwdziałać i zapobiegać objawom wynikającym ze zmian w trofizmie nabłonka oddechowego, takich jak: kaszel, wyciek z nosa, ból typowy dla zespołu objawów grypy, ale także związanymi z alergenami zewnętrznymi. **Skład** Suchy wyciąg z melisy lekarskiej *Melissa officinalis* (kwas rozmarynowy 12%), suchy wyciąg z pachnotki zwyczajnej *Perilla frutescens* (polifenole 2,5%), suchy wyciąg z macierzanki piaskowej *Timo serpyllifolium*, kwas hialuronowy, chlorek sodu 2%, jednowodny jednozasadowy fosforan sodu, dwuwodny dwuzasadowy fosforan sodu, maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona do 100 ml. **Sposób użycia** Do nebulizacji stosować 3 mililitrową fiolkę, 1 - 2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza, bez rozcieńczania. Produkt może być używany ze wszystkimi rodzajami nebulizatorów. **Ostrzeżenia** Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do inhalacji, nie spożywać ani nie stosować w inny sposób niż wskazany w instrukcji używania. Stosowanie w okresie ciąży, karmienia piersią i u dzieci należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować poniżej 2 roku życia, ponieważ w tym wieku cechy fizjologiczne dróg oddechowych wiążą się z ograniczoną zdolnością odprowadzania śluzu z oskrzeli. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W przypadku dolegliwości, takich jak skurcz oskrzeli, kaszel lub uczucie podrażnienia podczas stosowania, należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Podawanie leków drogą wziewną jednocześnie z roztworem do inhalacji powinno odbywać się pod nadzorem lekarza, który może ocenić możliwe interakcje.