

HEEL Euphorbium aerozol do nosa 20 ml



Cena: 48,01 pln

Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Dawka | - |
| Kraj produkcji | Niemcy |
| Opakowanie | 20 ml |
| Postać | aerozol do nosa |
| Producent/ Dystrybutor | BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH |
| Rejestracja | Lek homeopatyczny |
| Substancja czynna | - |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Skład Substancje czynne: 100 g roztworu zawiera: Euphorbium D4 1 g, Pulsatillapratensis D4 1 g, Luffa operculata D4 1 g, Hydrargyrum biiodatum D12 1g, Argentum nitricum D10 1 g. Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodofosforandwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, woda oczyszczona. **Wskazania** - nieżyty nosa o różnej etiologii (wirusowej, bakteryjnej, alergicznej), - nieżyty nosa o różnym stopniu nasilenia i przebiegu, - do leczenia pomocniczego w przypadku cuchnącego nieżyty śluzówki nosa i przewlekłego, - zapalenia zatok, - a także aby polepszyć drożność nosa przy katarze siennym. **Działanie** Euphorbium S spray do nosa działa stymulująco na błonę śluzową nosa, wywierając korzystny efekt regulujący w przebiegu zróżnicowanych chorób nosa i zatok przynosowych dzięki specyficznemu mechanizmowi oddziaływania. Lek usuwa typowe zmiany błony śluzowej nosa nie powodując przekrwienia i redukcji drożności przewodów nosowych. Ponieważ lek sporządzony jest na podstawie roztworu soli fizjologicznej, łatwo przenika do zatok i produkowanej przez błonę śluzową wydzieliny. Przeciwdziała to nadmiernemu wysychaniu błon śluzowych, umożliwia swobodne oddychanie oraz zapobiega dolegliwemu poczuciu ucisku w głowie. Przy długotrwałym stosowaniu nie obserwuje się spadku skuteczności jego działania. **Dawkowanie i sposób podawania** Dorosli i dzieci powyżej 12 lat: 1 – 2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 5 razy dziennie. Dzieci od 6 do 12 roku życia: 1 – 2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy dziennie. Dzieci od 2 do 6 roku życia: Po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. **Przeciwwskazania** W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę, może wystąpić skurcz oskrzeli. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Nie stosować poniżej 2 roku życia. **Działania niepożądane** Po zastosowaniu leku może pojawić się nadmierne ślinienie. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku. **Informacja** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.