PUH MAJ
Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

Procto-Glyvenol krem 30 g

Cena: 50,43 pln

Opis słownikowy

Dawka	(0,05g+0,02g)/g
Kraj produkcji	Irlandia
Opakowanie	30 g
Postać	krem doodbytniczy
Producent/ Dystrybutor	RECORDATI IRELAND LTD
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Procto-Glyvenol to krem doodbytniczy na hemoroidy bez recepty. Przeznaczony jest do miejscowego leczenia wewnętrznych i zewnętrznych hemoroidów. Krem Procto-Glyvenol zawiera dwie substancje czynne: tribenozyd i lidokainy chlorowodorek. Tribenozyd działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwświądowo. Zapobiega również uszkodzeniu śródbłonka naczyń krwionośnych. Lidokaina jest substancją miejscowo znieczulającą. Łagodzi przykre dolegliwości związane z hemoroidami, takie jak ból, świąd i pieczenie. **Właściwości** • Skuteczne leczenie hemoroidów. • Szybka ulga - działa już po 10 minutach! • Potrójny mechanizm działania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwświądowy. • Może być stosowany w ciąży (od 4-ego miesiąca) i podczas karmienia piersią. **Skład** Substancjami czynnymi kremu doodbytniczego na hemoroidy Procto-Glyvenol są tribenozyd (Tribenosidum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum). 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Substancjami pomocniczymi są: sorbitanu stearynian (Arlacel 60), makrogolu eter cetostearylowy (Cetomakrogol 1000), alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, kwas stearynowy i woda oczyszczona. **Sposób użycia** Podanie doodbytnicze. Krem doodbytniczy na hemoroidy Procto-Glyvenol® należy stosować rano i wieczorem, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz na dobę. W przypadku leczenia wewnętrznych hemoroidów, krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu, a po aplikacji umieścić na swoim miejscu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku. Należy dokładnie umyć ręce po każdym zastosowaniu leku. Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie należy stosować leku doustnie. Jeśli po upływie 7 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pojawiły się inne, nieobserwowane wcześniej objawy, należy zwrócić się do lekarza, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny tych dolegliwości. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.