PUH MAJ
Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

Voltaren Max żel 180 g

Cena: 70,93 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,0232 g/g
Kraj produkcji	Portugalia
Opakowanie	180 g (tuba)
Postać	żel
Producent/ Dystrybutor	NOVARTIS CONSUMER HEALTH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Voltaren MAX przynosi ulgę w bólu, redukuje stan zapalny i obrzęki występujące w okolicach mięśni i stawów. Voltaren MAX jest to biały, chłodzący, nietłusty, niebarwiący kremowy żel.**Działanie i zastosowanie**Voltaren MAX zawiera substancję czynną - diklofenak należący do grupy leków znanych, jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jestw miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń)bólu plecówograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawoweograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów**SkładSubstancją czynną leku jest**diklofenak dietyloamoniowy - 1 gram żelu zawiera 23,2 mg Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E 321), woda oczyszczona. **Sposób użycia i dawkowanie**Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę dla dorosłych i dzieci powyżej 14 lat. Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin. Należy go stosować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na bolące miejsca. **Sposób stosowania**1. W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy odkręcićzakrętkę, nałożyć ją odwrotną stroną na zabezpieczenie i przekręcić, co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.2.Następnie należy delikatnie wycisnąć niewielką ilość żelu z tubyi nałożyć na bolące lub spuchnięte miejsca, delikatnie wcierając w skórę. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: wystarczająca jest ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego. Podczas wcierania żelu odczuwalny jest delikatny efekt chłodzący.3.Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.