

## Borasol płyn 0,3 g/1g 500 g

Cena: 28,08 pln



### Opis słownikowy

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dawka                     | 0,03 g/g                                                      |
| Kraj produkcji            | Polska                                                        |
| Opakowanie                | 500 g                                                         |
| Postać                    | roztwór                                                       |
| Producent/<br>Dystrybutor | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE<br>PROLAB SP. Z O.O., PATEREK |
| Rejestracja               | Lek                                                           |
| Substancja<br>czynna      | Acidum boricum                                                |
| Wysyłka<br>zamówienia     | w 24 h                                                        |

### Opis produktu

Borasol w płynie zawiera kwas borny z dodatkiem wody oczyszczonej. Kwas borny posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Znajduje zastosowanie w stanach zapalnych skóry, dodatkowo wysusza i ściąga skórę. **Składniki** 1 g roztworu zawiera 30 mg kwasu borowego. Ponadto lek zawiera wodę oczyszczoną. **Wskazania** Stany zapalne skóry i zewnętrznych narządów moczowo-płciowych, wyprysk, oparzenia, stłuczenia, obrzęki, powierzchowne uszkodzenia naskórka. **Działanie** Bakterio- i grzybobójcze, ściągające i wysuszające. **Przeciwwskazania** Nie należy stosować doustnie, do oczu, na rozległe rany, skaleczenia, na duże powierzchnie skóry, u niemowląt. Nadwrażliwość na kwas borowy. Nie stosować u niemowląt i dzieci do 11 r.ż., a także na rozległe rany i skaleczenia otwarte. Nie stosować długotrwale. Nie łączyć z koloidalnymi roztworami srebra, metenaminą, balsamem peruwiańskim. Wykazuje niezgodności fizyko-chemiczne z koloidalnymi roztworami srebra, metenaminą, balsamem peruwiańskim. **Zalecane spożycie** Lek Borasol zawsze należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle przeciera się lekiem zmienione chorobowo miejsca od 2 do 3 razy na dobę. Stosować w postaci przymoczek, okładów i płukań. Stosować przez krótki okres czasu. **Możliwe działania niepożądane** Borasol może - podobnie, jak każdy inny lek - wywoływać działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one wystąpią. Długotrwałe stosowanie na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe może być przyczyną wysypki, zaczerwienienia skóry, złuszczenia naskórka, a także toksycznego działania układowego (zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci), którego objawami są wymioty, biegunka, drgawki, uszkodzenie narządów wewnętrznych (wątroba, nerki).