


Mucopect Kids syrop 200ml



Cena: 28,05 pln

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	200 ml (but.)
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Carbocisteinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Mucopect Kids jest lekiem, który zawiera substancję leczniczą o nazwie karbocysteina. Należy ona do grupy substancji zwanych „mukolitykami”, stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wydzielaniem śluzu w oskrzelach. Karbocysteina powoduje zmniejszenie lepkości śluzu (flegmy), dzięki czemu łatwiej usuwany jest z dróg oddechowych podczas kaszlu. Leku Mucopect Kids bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. **Wskazania** Lek Mucopect Kids jest stosowany w objawowym leczeniu chorób dróg oddechowych, przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Substancja czynna: Carbocisteinum **Skład** Substancją czynną leku jest karbocysteina. 1 mL syropu zawiera 50 mg karbocysteiny. Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel (E 150d), sacharoza, aromat agrestowy „Aroma grosella 63 2334” [glikol propylenowy, mrówczan etylu, octan izopentyli, 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 3-metylobutan-1-ol, gruszlina karbolistny (Barosma betulina) ekstrakt, kwas octowy, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one], sodu wodorotlenek i woda oczyszczona. **Dawkowanie i stosowanie syropu Mucopect Kids** Za pomocą miarki (łyżka miarowa o objętości 5 mL) należy odmierzyć ilość leku odpowiednią dla pacjenta (dziecka lub dorosłego) zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Łyżka miarowa stosowana do odmierzenia dawki doustnej ma objętość 5 mL i podziałkę wskazującą 1,25 mL, 2,5 mL, 3,75 mL i 5,0 mL. Zazwyczaj lek stosuje się następująco: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to: 15 mL syropu trzy razy na dobę. Po złagodzeniu objawów, dawkę należy zmniejszyć do 10 mL syropu trzy razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mL syropu trzy razy na dobę. Mucopect Kids nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Po przyjęciu dawki syropu należy dokładnie zamknąć butelkę. Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem. Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni. Zalecane jest przyjmowanie zwiększonej ilości płynów podczas stosowania leku Mucopect Kids. Lek Mucopect Kids należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Przeciwwskazania** do stosowania leku Mucopect Kids: uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy.