

Groprinosin Forte 1000 mg 10 tabletek



Cena: 37,11 pln

Opis słownikowy

Dawka	1 g
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent/ Dystrybutor	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	OTC
Substancja czynna	Inosinum pranobexum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Groprinosin Forte - opis i działanieGroprinosin Forte w tabletkach jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego), który jako substancję czynną posiada inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes. Groprinosin Forte wykazuje działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe, które wynika z wyraźnego pobudzenia odpowiedzi odpornościowej gospodarza in vivo pod wpływem działania leku.

Groprinosin Forte wskazania- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.- Leczenie opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Groprinosin Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.Substancja czynna: inosinum pranobexum**Skład**Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3). Jedna tabletkę zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu.Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian.Groprinosin Forte dawkowanieLek stosuje się doustnie, tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu, najlepiej wodą.Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.Zalecana dawka:Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę.Zazwyczaj dawka dobową wynosi 3 tabletki (3 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 3 razy na dobę).Maksymalna dawka dobową to 4 tabletki (4 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 4 razy na dobę). Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyNie należy stosować leku Groprinosin Forte u dzieci w 1. roku życia.Dzieci w wieku powyżej 1. roku życiaZalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek, zaleca się podawanie leku Groprinosin Forte w syropie.Groprinosin Forte przeciwwskazaniaUczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników leku.Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.**Zawartość**Opakowanie zawiera 10 tabletek.**Sposób przechowywania**poniżej 25°C