

Inuprin Forte syrop 0,1 g/ml 100 ml

Cena: 29,43 pln



Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/ml
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	100 ml
Postać	syrop
Producent/ Dystrybutor	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Inosinum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Inuprin Forte to lek w postaci syropu, który zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks. Wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego. Syrop Inuprin Forte przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1 roku życia oraz dorosłych. Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. **Wskazania do stosowania leku Inuprin Forte** Lek Inuprin Forte jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek Inuprin Forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Dawkowanie i stosowanie syropu Inuprin Forte** Zalecana dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeksu na dobę (czyli 40 ml syropu na dobę). Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 40 ml na dobę. Dzieci powyżej 1 roku życia Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby. Lek należy stosować doustnie. Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 5 do 14 dni. Zaleca się, aby po ustąpieniu objawów choroby przyjmować lek jeszcze przez 1 do 2 dni. Nie należy stosować leku Inuprin Forte u dzieci poniżej 1 roku życia. Lek Inuprin Forte należy zawsze przyjmować według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Przeciwwskazania do stosowania leku Inuprin Forte** jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła. Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. **Zawartość** Opakowanie leku Inuprin Forte zawiera 100 ml syropu oraz ulotkę.