

## Scorbolamid Extra Hot 8 sasz.



Cena: 21,78 pln

### Opis słownikowy

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dawka                     | 0,3g+0,3g+0,05g+5mg                      |
| Kraj produkcji            | Polska                                   |
| Opakowanie                | 8 sasz.                                  |
| Postać                    | gran.do sp.zaw.doust.                    |
| Producent/<br>Dystrybutor | ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.    |
| Rejestracja               | Lek                                      |
| Substancja czynna         | Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosi |
| Wysyłka zamówienia        | w 24 h                                   |

### Opis produktu

**Lek Scorbolamid Extra Hot zawiera** Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Rutozyd – pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm w walce z infekcją wirusową. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie. Kwas askorbowy (witamina C) - uzupełnia niedobór witaminy C, wspomaga organizm przy infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Wpływa na procesy związane z odpornością. Cynk – uzupełnia niedobór cynku, wspomaga odporność organizmu. **Wskazania** Gorączka i objawy związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, wspomaganie odporności organizmu w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C i cynk oraz uszczelnianie naczyń włosowatych. **Dawkowanie** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:** 1 saszetka 3 razy na dobę. Wysypać zawartość jednej saszetki leku Scorbolamid Extra Hot do pół szklanki ciepłej wody i dokładnie zamieszać. Wypić natychmiast zawiesinę powstałą po rozpuszczeniu granulatu. **Uwaga:** granulit nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu. Lek przyjmować po posiłku. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej należy prowadzić najkrócej jak to możliwe. Jeśli objawy nie ustąpią po 3-5 dniach leczenia lub nasilą się (nawet przed upływem tego czasu) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. **Substancja czynna:** złożone **Skład 1 saszetka zawiera** substancje czynne: 300 mg salicylamidu, 300 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu oraz 5 mg cynku w postaci glukonianu cynku pozostałe składniki to: mannitol SD100, mannitol M100, hydroksypropyloceluloza, kwas cytrynowy bezwodny, aromat cytrynowy, sukraloza, krzemionka koloidalna bezwodna