

Senamina 12,5 mg 14 tabletek



Cena: 43,82 pln

Opis słownikowy

Dawka	12,5 mg
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	14 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent/ Dystrybutor	ADAMED PHARMA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Doxylaminum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

DZIAŁANIELek przeciwhistaminowy o działaniu nasennym.**SPOSÓB UŻYCIAT**Tabletki należy przyjmować 30 minut przed snem popijając odpowiednią ilością płynu (najlepiej wody). Należy zapewnić co najmniej 8-godzinny odstęp między przyjęciem produktu leczniczego a planowaną pobudką.Dorośli (powyżej 18 lat): zalecana dawka to 12,5 mg do 25 mg (1 lub 2 tabletki), podawana 30 minut przed snem.W przypadku występowania senności w ciągu dnia zaleca się zmniejszyć dawkę z 25 mg do 12,5 mg lub przyjmować dawkę wcześniej, żeby zapewnić co najmniej 8-godzinny odstęp między przyjęciem produktu leczniczego a planowaną pobudką. Maksymalna dawka dobową to 25 mg (2 tabletki).Okres leczenia powinien być jak najkrótszy. Leczenie trwa zwykle od kilku dni do jednego tygodnia.Produkt leczniczy Senamina nie powinien być stosowany dłużej niż przez 7 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku braku poprawy po 7 dniach stosowania, produkt należy odstawić. W przypadku braku skuteczności wymagana jest konsultacja lekarska.Dzieci i młodzież: nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności doksyłaminy u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, dlatego produkt ten nie powinien być stosowany w tej populacji.Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg, podawana 30 minut przed snem. Dawkę można zwiększyć do 25 mg (2 tabletki), jeżeli dawka początkowa okaże się nieskuteczna do zniesienia bezsenności. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych dawkę należy zmniejszyć do 12,5 mg na dobę.**SKŁAD**1 tabletki powlekana zawiera: 12,5 mg doksyłaminy wodorobursztynianu.Substancje pomocnicze o znanym działaniu to: mannitol (E421). Każda tabletki produktu leczniczego Senamina zawiera 50,0 mg mannitolu.